

افزایش خطر مرگ در بیماران آلزایمری با مصرف داروهای ضد اضطراب

محققان دریافته اند خطر مرگ بیماران آلزایمری با آغاز مصرف داروهای سایکواکتیو افزایش می یابد.

به گزارش ایسکانیوز و به نقل از مهر، بنزودیازپین جز گروه داروهای سایکواکتیو که به عنوان اولین راه درمان اضطراب، بیقراری و بیخوابی در بین افراد مبتلا به آلزایمر استفاده می شود، ممکن است ریسک مرگ را تا ۴۰ درصد افزایش دهد.

بیماری آلزایمر یک بیماری پیشرونده است که حافظه و سایر عملکردهای مهم روانی را نابود می کند.

محققان دانشگاه فنلاند شرقی دریافته اند ریسک مرگ درست بعد از آغاز به مصرف بنزودیازپین و داروهای مرتبط افزایش می یابد.

افزایش ریسک مرگ ناشی از عوارض معکوس این داروها نظیر صدمات ناشی از زمین خوردن از جمله شکستگی لگن، و همچنین ذات الریه و سکته مغزی است.

در این مطالعه، تیم تحقیق ۱۰,۳۸۰ بیمار مصرف کننده بنزودیازپین و داروهای مرتبط را مورد بررسی قرار دادند. آنها این گروه را با ۲۰,۷۶۰ بیماری که این دارو را مصرف نکرده بودند مقایسه کردند.

محققان تاکید می کنند در صورت ضرورت تجویز این گروه از داروها، بهتر است فقط برای مصرف کوتاه مدت باشد.